

LAFELAX®

LACTULOZA 65%

Jarabe



FÓRMULA

Cada 100 ml de jarabe contiene: Lactulosa 65 g. Excipientes: Metilparabeno sódico, Propilparabeno sódico, Sacarina sódica, Ciclamato de sodio, Esencia de frutilla líquida, Ácido clorhídrico c.s.p. pH, Agua purificada c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Laxante osmótico.

INDICACIONES

Se usa para el tratamiento de la constipación.

MODO DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Este medicamento puede ser tomado puro o diluido en agua.

POSOLOGÍA

La dosificación se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente.

Como posología media de orientación se aconseja:

Constipación:

Adultos:

Tratamiento de ataque: de 1 a 3 tomas de 15 ml/día.

Mantenimiento: de 10 ml/día a 25 ml por día.

Si se manifiesta diarrea disminuir la posología.

Niños:

De 7 a 14 años:

Tratamiento de ataque: 15 ml/día.

Mantenimiento: 10 ml/día.

De 1 a 6 años:

de 5 a 10 ml/día.

Lactantes: 5 ml/día.

La cantidad puede ser administrada en una única dosis diaria (preferentemente a la mañana con el estómago vacío o a la noche antes de cenar).

Equivalencias: 1 cucharada sopa: 15 ml de solución = 10 g de lactulosa.

1 cucharadita de té: 5 ml de solución = 3 g de lactulosa.

CONTRAINDICACIONES

Colopatías orgánicas inflamatorias (rectocolitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), síndrome oclusivo o subocclusivo, dolores abdominales sin causa determinada.

Pacientes con dieta libre de galactosa.

ADVERTENCIAS

No use en caso de dolor abdominal, náuseas y vómitos.

PRECAUCIONES

Debido al hecho que la lactulosa es un disacárido no absorbible, su administración a las dosis recomendadas para la constipación no está contraindicada en el embarazo, la diabetes y los niños. Es aconsejable una dosificación cautelosa en los síndromes gastro-cardíacos, donde se recomienda comenzar con dosis bajas e ir aumentándolas gradualmente, para evitar un meteorismo excesivo.

En la alimentación de pecho del niño la prescripción de laxantes debe ser excepcional, ya que se debe tener en cuenta el riesgo de obstruir el funcionamiento normal del reflejo de defecación.

Esta especialidad contiene lactosa. En caso que aparezcan diarreas debe consultarse al médico. No utilizar laxantes por más de una semana por constipación a menos que el médico lo continúe prescribiendo.

Este laxante puede no producir resultados en las primeras 24-48 horas.

11-4212/D	Formato: 150x120 mm - Plegado: 1/4 vertical envolvente - Final: 150x30 mm Pantone: 647 C DEDICADO Paraguay			12/03/2024
Emite	Revisa	Revisa	Revisa	Aprueba
(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)
(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)
Observaciones	(Formato)		(Plegado)	

Embarazo y lactancia: Los estudios realizados en animales no demuestran evidencia de efectos teratogénicos; igualmente la utilización de lactosa no es aconsejable durante el embarazo a menos que sea absolutamente necesario.

Interacciones

No lo tome si está tomando diuréticos ahorreadores de potasio o suplementos de potasio debido a que puede alterar el efecto terapéutico de estos.

REACCIONES ADVERSAS

El producto es habitualmente bien tolerado. Raramente puede presentarse meteorismo y flatulencia de poca intensidad; hinchazón, en la mayoría de los casos tales manifestaciones remiten espontáneamente o desaparecen después de 2 o 3 días de tratamiento. En casos excepcionales, después de un tratamiento prolongado e intenso puede ocurrir una pérdida de electrolitos. En caso de diarrea profusa es aconsejable reducir la dosis.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

- Esta medicación deberá ser usada bajo vigilancia médica.
- Esta medicación no deberá ser usada para ninguna otra enfermedad diferente a la que motivó la prescripción.
- El paciente deberá reportar cualquier signo de intolerancia a la medicación.

SOBREDOSIS

En caso de utilizar más de lo debido, se deberá suspender el tratamiento.

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Intoxicaciones: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011)-4962-2247 o (011)-4962-6666 Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/ 4658-7777.

En caso de sobredosis concurrir al Centro Paraguayo de Toxicología. Av. Gral. Santos y FR Moreno. Asunción. Tel. 204 800

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 120, 250 ml de jarabe.

CONSERVAR EN EL ENVASE ORIGINAL, A TEMPERATURA NO MAYOR DE 30°C. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SI PERSISTEN LOS SÍNTOMAS, CONSULTE CON EL MÉDICO.

E.M.A.M. Certificado Argentino N°50.195 - Reg. Sanitario Paraguay: MS-002647-02

Venta autorizada por DINAVISA

Fabricado por: LAFEDAR S.A.

Valentín Torrá 4880. Parque Industrial Gral. Belgrano (C.P.3100) Paraná, Entre Ríos, Argentina.

Directora Técnica: M. Cristina Zuso. Farmacéutica.

En Paraguay importado y distribuido por: Bioethic Pharma S.A.

Tacuary 221 esq. Eligio Ayala. Asunción, Paraguay.

Regente: Q.F Andrea Paciello. - Reg. Prof. N°4637

11-4212/D



11-4212/D	Formato: 150x120 mm - Plegado: 1/4 vertical envolvente - Final: 150x30 mm Pantone: 647 C DEDICADO Paraguay			12/03/2024
Emite	Revisa	Revisa	Revisa	Aprueba
(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)	(Firma y sello)
(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)	(Fecha)
Observaciones	(Formato)		(Plegado)	