



CIPROFIBRATO 100 mg BIOETHIC PHARMA

CIPROFIBRATO 100 mg

Venta bajo receta
Industria Paraguaya

Comprimidos
Vía:Oral

FORMULA

Cada comprimido contiene:

Ciprofibrato100 mg

Excipientesc.s.p.

ACCION TERAPEUTICA:

ANTILIPEMICOS

INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento de Hiperlipidemia primaria resistente a manejo con dieta apropiada, incluyendo hipercolesterolemia, hipertriglicidemia e hiperlipidemia mixta.

ACCION FARMACOLOGICA

El Ciprofibrato reduce principalmente los triglicéridos del plasma, entre el 10% y el 40%, y en mucho menor grado y de forma más inconstante el colesterol. Esto se aprecia en un notable descenso de las VLDL, una disminución menor o nula de las LDL y a veces un aumento de las HDL. Puede reducir el riesgo de eventos coronarios en pacientes con HDL bajo o triglicéridos elevados. La absorción del Ciprofibrato es rápida y casi completa. En pacientes en ayunas la concentración máxima en el plasma se alcanza en aproximadamente 1 hora; si se ingiere con alimentos la absorción demora de 2 a 3 horas. La vida media terminal, determinada en un estudio con isótopo C14 en varones voluntarios en ayunas, es de $88,6 \pm 11,5$ horas. En pacientes con insuficiencia renal severa puede aumentar significativamente la vida media de eliminación.

4013675

POSOLOGIA

Adultos y Ancianos: La dosis recomendada es de 100 mg una vez al día.

Niños: No se recomienda, porque la seguridad y eficacia en niños no ha sido establecida

Insuficiencia renal moderada: Se recomienda que la dosis sea reducida a un comprimido interdiaria. El Ciprofibrato no debe emplearse en insuficiencia renal severa.

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia hepática grave, Insuficiencia renal grave, Hipersensibilidad al principio activo.

Asociación con otros fibratos Embarazo y Lactancia.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Este medicamento debe ser utilizado con prudencia en los pacientes que presentan insuficiencia hepática. En tales caso se recomienda vigilar regularmente la función hepática. En caso de persistir las anomalías de las enzimas hepáticas, interrumpir el tratamiento con Ciprofibrato. Dede ser utilizado con prudencia en los pacientes que presentan insuficiencia renal. Puede causar síndrome de miositis, especialmente en pacientes con deterioro de la función renal. Debe discontinuarse de presentar dolores musculares, debilidad o incremento de la creatina fosfocinasa sérica (CPK). Debe descartarse el riesgo de hipotiroidismo que causa dislipidemia secundaria y además aumenta el riesgo de miopatía.

INTERACCIONES

Con las Cumarinas incrementan el efecto anticoagulantes.

Ezetimibe debe evitarse los fibratos.

Los fibratos pueden mejorar la tolerancia a la glucosa y tener un efecto aditivo con la insulina y sulfonilureas respectivamente.

El uso concomitante de la Rosuvastatina y las Estatinas aumenta el riesgo de miopatía.

El Ciprofibrato se une a las proteínas plasmáticas en elevada medida, por lo tanto puede desplazar a otras drogas que siguen un comportamiento análogo. El Ciprofibrato potencia el efecto de la warfarina, en consecuencia, la dosis de este medicamento debe reducirse y ajustarse de acuerdo al tiempo de protrombina. El Ciprofibrato puede potenciar el efecto de agentes hipoglicemiantes orales, no hay informes de que ésta interacción cause problemas de significación clínica.

RESTRICCIONES DE USO

Uso profesional.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente cefalea, vértigo erupción cutánea y síntomas gastrointestinales de naturaleza leve y moderada, incluyendo náuseas, vómitos, diarrea y dispepsia. Al igual que otros fibratos, se han observado ocasionalmente, pruebas de función hepática anormales. Como en otras drogas de su clase, se han reportado casos aislados de mialgia y miopatía, incluyendo miositis y casos aislados de rabdomiólisis.

SOBREDOSIFICACION

No hay informes de sobredosis con Ciprofibrato. En caso de que exista, deberá eliminarse el fármaco mediante emesis o lavado del estómago e instituirse el tratamiento sintomático apropiado. El Ciprofibrato no es dializable.

Ante la eventualidad de una sobredosis acudir al Centro Paraguayo de Toxicología. Av Gral. Santos y F.R Moreno. Asunción – Paraguay. Tel: 204 800.

PRESENTACION

Caja conteniendo 10 comprimidos.

Caja conteniendo 20 comprimidos.

Caja conteniendo 30 comprimidos.

CONSERVACION:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° a 30°C

Mantener Fuera del Alcance de los Niños

ELABORADO POR:

Quimfa S.A. -Av. Primer Presidente N° 1736

c/ Yrendagüe.

Tel.: (021) 289 4000 R.A.

Asunción - Paraguay.

Para: Bioethic Pharma S.A

Tacuary 221 esq. Eligio Ayala

Asunción – Paraguay.- Tel. 492 032

Director técnico: Q.F Andrea J. Paciello Recalde .

Reg. Prof. N° 4637

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Certificado de Registro Sanitario N° 23420-01-EF